

**ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN ASFIKSIA
DENGAN PENERAPAN METODE SWADDLING
SELAMA PEMASANGAN INFUS DI RUANG
CAMAR RUMAH SAKIT DAERAH
KALISAT**

Karya Ilmiah Akhir Ners



**OLEH :
ANIS LUTHFIAH
NIM 24101183**

**PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS dr. SOEBANDI
JEMBER
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN ASFIKZIA DENGAN PENERAPAN METODE *SWADDLING* SELAMA PEMASANGAN INFUS

Di Ruang Camar -RSD Kalisat

KARYA ILMIA AKHIR NERS

Disusun Oleh
ANIS LUTHFIAH
NIM. 24101183

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam ujian sidiang karya ilmiah akhir ners pada tanggal 22 Bulan Agustus Tahun 2025 dan telah di terima sebagai bagian persyaratan yang di perlukan untuk meraih gelar Ners pada Program Studi Profesi Ners Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas dr. Soebandi Jember

DEWAN PENGUJI

- Penguji 1 : Umi Sukowati, S.Kep.,Ns.,M.Kep.,Sp.Mat ()
NIDN. 8894401019
- Penguji 2 : Arif Candra Gunawan S.Kep.,Ners ()
NIP. 19810825 200801 1 012
- Penguji 3 : Lailil Fatkuriyah, S.Kep., Ns., MSN ()
NIDN. 703118802


Ketua Program Studi Profesi Ners,
(Emi Eliya Astutik S.Kep.,Ns.,M.Kep.)
NIDN. 0720028703

ABSTRAK

Anis Luthfiah¹, Lailil Fatkuriyah ², Umi Sukowati ³. 2025. **ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN ASFIKSIA DENGAN PENERAPAN METODE SWADDLING SELAMA PEMASANGAN INFUS DI RUANG CAMAR RUMAH SAKIT DAERAH KALISAT**. Karya Ilmiah Akhir Ners. Program Studi Profesi Ners, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas dr. Soebandi Jember.

Latar Belakang: Asfiksia neonatorum adalah keadaan gawat bayi yang tidak dapat bernafas spontan dan teratur, sehingga dapat meurunkan oksigen dan semakin meningkatkan karbon dioksida yang menimbulkan akibat buruk dalam kehidupan lebih lanjut.

Tujuan: Penelitian ini untuk menerapkan intervensi keperawatan berbasis bukti yaitu penerapan metode swaddling untuk meminimalkan nyeri pada bayi dengan asfiksia selama prosedur invasif pemasangan infus di ruang Camar Rumah Sakit Daerah Kalisat.

Metode: Metode penelitian ini menggunakan desain studi kasus dengan menggunakan pendekatan asuhan keperawatan yaitu pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi dan evaluasi. Sampel yang di ambil sebanyak dua orang yang sesuai dengan kriteria inklusi penelitian. Prioritas intervensi untuk meminimalkan nyeri pada bayi selama dilakukan tindakan prosedur invasif pemasangan infus adalah intervensi penerapan metode swaddling dengan mengukur skala nyeri bayi dan memonitor keadaan umum pada bayi. Pemberian metode swaddling tersebut dilakukan selama pemasangan infus.

Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa skala nyeri yang dirasakan bayi lebih ringan setelah diberikan intervensi keperawatan dengan metode swaddling. Pemberian metode swaddling dapat dijadikan sebagai bagian dari asuhan perkembangan pada bayi yang diberikan tindakan prosedur invasif.

Kata kunci: *Swaddling, asfiksia, NIPS*

¹ Peneliti

² Pembimbing 1

³ Pembimbing 2

ABSTRACT

Anis Luthfiah¹, Lailil Fatkuriyah², Umi Sukowati³. 2025. **NURSING CARE FOR PATIENTS WITH ASPHYXIA USING THE SWADDLING METHOD DURING INFUSION INSTALLATION IN THE CAMAR ROOM, KALISAT REGIONAL HOSPITAL.** Nursing Final Project. Nursing Professional Study Program, Faculty of Health Sciences, Dr. Soebandi University, Jember.

Background: Neonatal asphyxia is a critical condition in which a baby is unable to breathe spontaneously and regularly. This can lead to decreased oxygen and increased carbon dioxide levels, which can have adverse consequences for later life.

Objective: This study aimed to implement evidence-based nursing interventions, namely the swaddling method, to minimize pain in infants with asphyxia during the invasive procedure of infusion insertion in the Camar ROOM, Kalisat Regional Hospital.

Methods: This research used a case study design with a nursing care approach, namely assessment, nursing diagnosis, intervention, implementation, and evaluation. Two individuals were sampled who met the study's inclusion criteria. The priority intervention to minimize pain in infants during the invasive IV procedure was the application of the swaddling method, which measured the infant's pain scale and monitored the infant's general condition. The swaddling method was administered during the IV insertion.

Results: The study showed that the infant's pain scale was less severe after the nursing intervention using the swaddling method. Swaddling can be used as part of developmental care for infants undergoing invasive procedures.

Keywords: Swaddling, asphyxia, NIPS

1 Researcher

2 Supervisor 1

3 Supervisor 2