

**HUBUNGAN PARITAS DENGAN LAMA PERSALINAN
NORMAL KALA 2 DI RUANG BERSALIN
RSUD dr. HARYOTO
LUMAJANG**

SKRIPSI



**Oleh :
Ayu Nouva Zurraida
NIM. 25104109**

**PROGRAM STUDI KEBIDANAN PROGRAM SARJANA
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS dr.SOE BANDI
2026**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul *Hubungan Paritas Dengan Lama Persalinan Normal Kala 2 Di Ruang Bersalin RSUD dr. Haryoto Lumajang* telah diuji dan disahkan oleh Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan pada:

Nama : AYU NOUVA ZURRAIDA

NIM : 25104109

Hari, Tanggal : 29 Juli 2026

Program Studi : Program Studi Kebidanan Program Sarjana Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas dr. Soebandi

Tim Penguji
Ketua Penguji,




Asri Iman Sari, S.ST. M.Keb
NIDN : 0728069002

Anggota Penguji I,



Dini Eka Pripuspitasari, S.ST., M.Keb
NIDN : 07030388

Anggota Penguji II,



Zaida Mauludiyah, S.Keb, Bd, M.Keb
NIDN: 0727108707

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas dr. Soebandi



Ai Nur Zannah, S. ST., M. Keb
NIDN: 0719128902

ABSTRAK

Tahap kedua persalinan merupakan proses pengeluaran bayi yang dimulai sejak serviks membuka lengkap sampai bayi lahir. Salah satu faktor yang dapat memengaruhi durasi tahap kedua adalah paritas ibu. Pada ibu primipara, lama tahap kedua umumnya lebih lama karena otot dasar panggul belum elastis. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis hubungan antara paritas dengan durasi persalinan normal tahap kedua di Ruang Bersalin RSUD dr. Haryoto Lumajang tahun 2025. Rancangan penelitian yang dipakai adalah kuantitatif dengan pendekatan korelasi retrospektif. Populasi penelitian mencakup semua ibu yang menjalani persalinan normal spontan dan terdata di ruang bersalin RSUD dr. Haryoto Lumajang. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling dengan besar sampel 50 orang ibu bersalin normal yang sesuai kriteria inklusi. Instrumen penelitian berupa lembar observasi partograf serta data rekam medis. Pengolahan data menggunakan uji *Fisher-Freeman-Halton Exact Test* pada tingkat kemaknaan $p < 0,05$. Hasil penelitian menunjukkan responden terbanyak adalah primipara sejumlah 23 orang (46,0%) dan sebanyak 39 orang (78,0%) mengalami lama tahap kedua yang cepat yaitu < 30 menit. Hasil uji *Fisher-Freeman-Halton Exact Test* didapatkan nilai $p\text{-value} = 0,038 (< 0,05)$ yang menunjukkan terdapat hubungan antara paritas dengan lama persalinan normal tahap kedua. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ada hubungan antara paritas ibu dengan lama tahap kedua. Rekomendasi bagi tenaga kesehatan yaitu hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan dalam pemberian KIE kepada pasien dan keluarga, terutama pada ibu primipara. Tenaga kesehatan perlu lebih waspada terhadap risiko persalinan dengan durasi lama, serta memberikan pendampingan intensif dan dukungan agar ibu merasa lebih siap, tenang, dan mendapat dukungan selama proses persalinan.

Kata Kunci: Paritas, Lama Kala 2, Persalinan Normal