

**ASUHAN KEBIDANAN *CONTINUITY OF CARE* (COC) PADA
NY. “R” DI WILAYAH KERJA TPMB RENIS VIANITY
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2026**



Oleh:

**Ida Lailatul Fitriani
NIM 25106103**

**PRODI PENDIDIKAN PROFESI BIDAN PROGRAM PROFESI
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS dr. SOEBANDI
2026**

**ASUHAN KEBIDANAN *CONTINUITY OF CARE* (COC) PADA
NY. “R” DI WILAYAH KERJA TPMB RENIS VIANTY
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2026**

Diajukan Sebagai salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Profesi Bidan (Bd)



Oleh :

**Ida Lailatul Fitriani
NIM 25106103**

**PRODI PENDIDIKAN PROFESI BIDAN PROGRAM PROFESI
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS dr. SOEBANDI
2026**

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir dengan judul "Asuhan Kebidanan *Continuity Of Care* pada Ny. R di wilayah kerja TPMB Renis Vianty Kabupaten Jember Tahun 2026" telah diperiksa dan dipertahankan dihadapan tim penguji.

Nama : Ida Lailatul Fitriani

NIM : 25106103

Hari, Tanggal : Selasa, 7 Juli 2026

Tempat : Progam Studi Kebidanna Program Sarjana Universitas dr. Soebandi

Tim Penguji

Ketua Penguji



Trisna Pangestuning Tyas, S.ST., M.Kes
NIDN. 0704078804

Penguji 1



Asmak Mukhayyah, S.Tr., Keb
NIP. 1968052319920320005

Penguji 2



Dinar Perbawati, S.ST., M.Kes
NIDN. 0709059105

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas dr. Soebandi



Af Nur Zannah, S.ST., M.Keb
NIDN. 0719128902

SINOPSIS

Asuhan Kebidanan *Continuity Of Care (COC)* pada Ny.”R” di Wilayah Kerja TPMB Renis Vianty Kabupaten Jember Tahun 2026.2026. Ida Lailatul Fitriani, Dinar Perbawati,

Masa Kehamilan, persalinan, nifas, neonatus merupakan suatu keadaan fisiologis yang kemungkinan dapat mengancam jiwa ibu dan bayi bahkan dapat menyebabkan kematian. Salah satu upaya yang dapat dilakukan bidan yaitu dengan menerapkan model asuhan kebidanan yang komprehensif/berkesinambungan atau disebut dengan COC (*Continuity of Care*). Berdasarkan survey demografi kesehatan Indonesia tahun 2021 AKI mencapai 305/100.000 KH, di Jawa Timur sendiri angkanya berhasil turun pada 2022. Berdasarkan Dinkes AKI di Jatim 2022 berjumlah 93/100.000, sedangkan di Jember sebanyak 58 kasus tahun 2022 dan turun menjadi 47 kasus di 2023. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti menggunakan studi kasus yaitu dengan cara peneliti memperoleh informasi langsung dari pasien dengan metode *continuity of Care (COC)* pada Ny. R G2P1A0 di TPMB Renis Vianty. Pada kunjungan pertama di UK 38 minggu ibu mengeluh sering BAK, tatalaksanaan yang diberikan adalah dengan membatasi konsumsi minuman yang bersifat diuretic. Persalinan terjadi di 39 minggu pervagina di TPMB Renis Vianty tanpa adanya gangguan karena sebelumnya sudah tercukupi nutrisinya, cara mengejan yang baik dan dukungan psikologis. Bayi lahir secara spontan, langsung menangis, kulit kemerahan dan bergerak aktif. Kunjungan nifas I, II, III, IV berjalan dengan lancar. Ny. R menggunakan KB suntik 3 bulan dengan alasan ingin menggunakan KB yang sudah pernah digunakan sebelumnya. Tapi penulis tetap memberikan edukasi mengenai jenis metode KB yang lain dengan tujuan untuk memberikan gambaran metode kontrasepsi jangka Panjang

SYNOPSIS

Continuity of Care (COC) Midwery Care for Mrs. “R” at the Renis Vianty Midwife Practices Independently Jember Recency in 2026. 2026. Ida Lailatul Fitriani, Dinar Perbawati

Pregnancy, , childbirth, postpartum, and the neonatal period are physiological conditions that can potentially threaten the lives of both mother and baby and even lead to death. One effort midwives can make is to implement a comprehensive/continuous midwifery care model, also known as continuity of care. Based on the 2021 Indonesian health demographic survey, the MMR reached 305/100,000 live births, in East Java itself the figure managed to decrease in 2022. Based on the Health Office, the MMR in East Java in 2022 was 93/100,000, while in Jember there were 58 cases in 2022 and decreased to 47 cases in 2023. The approach used by the researcher was a case study, namely by the researcher obtaining information directly from the patient using the Continuity of Care (COC) method on Mrs. R G2P1A0 at midwife practices independently Renis Vianty. At the first visit to the gestational age at 38 weeks, the mother complained of frequent urination; the treatment provided was to limit the consumption of diuretic drinks. Labor occurred at 39 weeks vaginally at midwife practices independently Renis Vianty without any complications due to adequate nutrition, proper pushing techniques, and psychological support. The baby was born spontaneously, cried immediately, had reddish skin, and was actively moving. Postpartum visits I, II, III, and IV went smoothly. Mrs. R used a 3-month injection because she wanted to use the contraceptive she had previously used. However, the author continues to provide education on other types of contraceptive methods with the aim of providing an overview of long-term contraceptive methods.